

Plattenepithelkarzinom oder PLEP-Ca. oder Spinaliom

Spontan, aus Basaliomen oder auch aus diesen Vorstufen mit verstärkter Keratose-Bildung (Hornhautverdickungen) können sich in weiterer Folge Karzinome der Haut entwickeln, also Hautkrebs unterschiedlicher Stadien (1 bis 3), der dann im fortgeschrittenen Stadium (Stadium 3) allerdings **auch Metastasen bilden kann**. Es ist deshalb wichtig, verdächtige Tumore prinzipiell genau zu untersuchen, ggfs. mit Biopsie die Diagnose weiter abzuklären und bei Tumorbestätigung umgehend weitere Untersuchungen (Lymphknoten Ultraschall, Lungen-Röntgen etc.) durchzuführen und entsprechend zu behandeln. Diese Art von Hauttumoren erfordert **spezialisierte onkologische Chirurgie zur sicheren Tumorentfernung** und dann **plastisch rekonstruktive Chirurgie**, um die entstandenen Hautdefekte wiederherzustellen. Bei diesen Tumoren muss die Exzision mit mehreren mm Sicherheitsabstand etwas weiter im Gesunden erfolgen, als beispielsweise bei Basaliomen, da sie eher zum Rezidiv, d.h. zum neuerlichen und dann auch zum rascheren Nachwachsen neigen.